Soluzioni per la difesa delle Drupacee

pesco, nettarino, susino, ciliegio e albicocco

Edizione 2024

Soluzioni per la difesa delle Drupacee

pesco, nettarino, susino, ciliegio e albicocco

Il nostro impegno per la frutticoltura italiana

La filiera della frutta *rappresenta una parte importante dell'agroalimentare italiano: grazie all'elevato livello di* ***competenza*** *e alla* ***dedizione*** *di produttori e tecnici, la* ***frutticoltura italiana*** *offre prodotti di alta qualità ai consumatori sia italiani che di ogni parte del mondo, garantendo* ***standard qualitativi sempre molto elevati****.*

Le caratteristiche varietali, unite alle esigenze di ogni singolo mercato, rendono il ***mondo della frutticoltura soggetto a numerose sfide ed esigenze****, sia di natura tecnica (parassiti e malattie emergenti) che legate a nuovi mercati (esportabilità e conservabilità dei prodotti), nonché della grande distribuzione (certificazioni, sanità degli alimenti…).*

Per questo motivo, ***i nostri tecnici lavorano quotidianamente*** *al fianco dei frutticoltori italiani* ***per poter fornire*** *loro* ***tutto il supporto possibile*** *e* ***affrontare al meglio queste nuove sfide****.*
Tramite un'offerta di prodotti completa, che va da soluzioni innovative di origine chimica a proposte di origine naturale ed ammesse in agricoltura biologica, Bayer offre una gamma in grado di soddisfare le esigenze della filiera.

Afidi

IL PROBLEMA

Le drupacee sono abitualmente infestate da numerose specie di afidi. Pesco e nettarine sono suscettibili alle infestazioni di gran parte delle specie afidiche *(Myzus, Brachycaudus, Hyalopterus ecc.)*, il ciliegio è insidiato quasi esclusivamente da *Myzus cerasi*, diverse sono le specie che attaccano il susino e poco importanti le infestazioni su albicocco.

La corretta identificazione dell'afide infestante assume importanza pratica ai fini del controllo, poiché ognuno presenta comportamenti biologici differenti (generazioni, modalità di svernamento, cicli, piante ospiti primarie e secondarie, tempistiche di infestazioni), con sintomi e danni (colonie su gemme, sugli apici, su foglie e su frutticini; decolorazioni e deformazioni dei frutti con possibile cascola; necrosi, accartocciamento delle foglie ed arresto vegetativo; foglie arrotolate a sigaro; produzione di melata; trasmissione di virus come la Sharka) a volte anche diversi.

Le specie più comuni sono: afide verde del pesco *(Myzus persicae)*, afide nero del pesco *(Brachycaudus persicae)*, bruno del pesco *(Brachycaudus schwartzi)*, afide farinoso del pesco e del susino *(Hyalopterus spp.)*, afide verde del susino *(Brachycaudus helichrysi)*, afide nero del ciliegio *(Myzus cerasi).*

MOVENTO® 48 SC — 1 L, 5 L

Quando: dalla scamiciatura alla comparsa dei primi individui.

Dose: 250 ml/hl (2,5-3,75 L/ha)

FLiPPER® — 5L

Quando: ad inizio infestazione.

Dose: 4-10 L/ha 1-2 L/hl

Consentito in BIOlogica Agricoltura

DI ORIGINE NATURALE by Bayer

decis evo — 250 ml, 1 L, 5 L

Quando: in pre-fioritura, alla comparsa del parassita.

Dose: 30-50 ml/hl (0,3-0,7 L/ha)

Cocciniglie

IL PROBLEMA

Le drupacee sono soggette agli attacchi di diverse cocciniglie, le più importanti sono:

- Cocciniglia di S. José *(Quadraspidiotus perniciosus)* che attacca sia le pomacee che le drupacee compiendo 3 generazioni l'anno;
- Cocciniglia bianca del pesco *(Pseudaulacaspis pentagona)* che attacca principalmente le drupacee compiendo 2-3 generazioni all'anno.
- Cocciniglia comstocki (Pseudococcus comstocki), originaria dell'Asia centrale, in grado di svolgere almeno 3 generazioni con svernamento come uovo nelle screpolature della corteccia.

I danni derivano dalle punture di nutrizione. Le infestazioni provocano disseccamento, deperimento dei rami e macchie rosse sui frutti.

MOVENTO® 48 SC — 1 L, 5 L

Quando: in post-fioritura a inizio migrazione neanidi.

Dose: 300 ml/hl (3-4,5 L/ha)

Oliocin® PLUS — 25 L

Quando: alla comparsa del parassita

Dose: 2,5-4 L/hl (25-40 L/ha)

Consentito in BIOlogica Agricoltura

Focus on

FLIPPER

Flipper è l'innovativo insetticida-acaricida a base di acidi carbossilici insaturi, la cui origine è l'olio d'oliva di alta qualità. Flipper è quindi un prodotto di origine naturale e autorizzato in agricoltura biologica, perfetto anche per completare le strategie di gestione integrata delle colture.

Flipper agisce per contatto e controlla tutti gli insetti che hanno in parte o del tutto il corpo molle e sono quindi penetrabili dagli acidi carbossilici insaturi. È efficace dunque contro afidi, aleurodidi, cicaline, tripidi, psille, cocciniglie e acari.

Si consiglia di utilizzare **Flipper** ad inizio infestazione, impiegando volumi di acqua adeguati a bagnare completamente la vegetazione. Non avendo tempi di carenza e non lasciando residui normati, il prodotto può essere utilizzato anche sotto raccolta; è inoltre selettivo nei confronti degli insetti pronubi.

Mosche

IL PROBLEMA

Sono presenti tre specie di mosche che attaccano le drupacee:

- *Ceratitis capitata* e *Bactrocera dorsalis* vivono a spese di svariate piante da frutto quali albicocco, pesco, susino e pomacee;
- *Rhagoletis cerasi* vive principalmente a spese del ciliegio.

Le larve di entrambe le specie si sviluppano all'interno nella polpa dei frutti compromettendone l'accrescimento, la qualità e la commercializzazione.

decis evo — 250 ml, 1 L, 5 L

Quando: alla comparsa del parassita

Dose: 30-50 ml/hl (0,3-0,7 L/ha)

decis trap — Ceratitis — 20 trappole

Quando: 40-50 giorni prima dell'invaiatura oppure 50 giorni prima della raccolta.

Dose: 80 trappole/ha

Consentito in BIO logica Agricoltura

DI ORIGINE NATURALE by Bayer

Oliocin® PLUS — 25 L

Quando: alla comparsa del parassita

Dose: 2,5-4 L/hl (25-40 L/ha)

Consentito in BIO logica Agricoltura

decis trap — Drosophila — 20 trappole

Quando: all'inizio del periodo a rischio, applicare da ingrossamento grappolo/pre-invaiatura.

Dose: 50-100 trappole/ha

DI ORIGINE NATURALE by Bayer



Cimice asiatica

IL PROBLEMA

La *Halyomorpha halys* (cimice asiatica) è una cimice originaria dell'Asia orientale che attacca svariate colture, segnalata per la prima volta in Italia nel 2012.

Su frutta il danno è causato dalle punture di nutrizione a carico dei frutti compiute da tutti gli stadi mobili dell'insetto.

Punture precoci possono provocare la cascola o la malformazione dei frutti, mentre punture tardive determinano la comparsa di zone decolorate e depresse con la presenza di necrosi e polpa spugnosa.

decis evo — 250 ml, 1 L, 5 L

Quando: alla comparsa del parassita.

Dose: 30-50 ml/hl - (0,3-0,7 L/ha)

FLiPPER® — 5L

Quando: ad inizio infestazione.

Dose: 4-10 L/ha in etichetta (1-2 L/hl)

Consentito in BIO logica Agricoltura

DI ORIGINE NATURALE by Bayer



Acari

IL PROBLEMA

Gli acari sono artropodi appartenenti alla sottoclasse degli aracnidi.
I principali acari dannosi in frutticoltura si possono raggruppare in due grandi famiglie: tetranichidi (*Panonychus ulmi, Tetranychus urticae*) ed eriofidi (*Aculus schlechtendali*).

I sintomi si manifestano sulle foglie che si disidratano, assumono colore bronzeo, ingialliscono e cadono precocemente e sui frutti che presentano aree rugginose.

Lo sviluppo degli acari può essere parzialmente controllato da numerosi predatori, pertanto è importante l'utilizzo di prodotti selettivi.

FLiPPER® — **5L**

Quando: ad inizio infestazione.
Dose: 4-10 L/ha (1-2 L/hl)

Oliocin® PLUS — **Uova di Acari** — **25 L**

Quando: alla comparsa del parassita
Dose: 2,5-4 L/hl (25-40 L/ha)

Tripidi

IL PROBLEMA

Danneggiano fiori e frutticini di nettarine e cultivar di pesche con superficie poco tomentosa, con le punture di nutrizione. La saliva tossica iniettata provoca deformazioni e lesioni superficiali che successivamente necrotizzano e suberificano. Il frutto delle nettarine, per mancanza del rivestimento peloso, è maggiormente esposto.
Gli attacchi si verificano a partire dalla fase di bottone rosa, ma anche in prossimità della maturazione.

Le specie più diffuse sono *Thrips meridionalis, Thrips major, Thrips tabaci e Frankliniella occidentalis,* quest'ultima attacca principalmente in pre-raccolta.

FLiPPER® — **5L**

Quando: ad inizio infestazione.
Dose: 4-10 L/ha (1-2 L/hl)

decis® evo — **250 ml, 1 L, 5 L**

Quando: trattamenti in pre-fioritura contro i tripidi primaverili.
Dose: 30-50 ml/hl (0,3-0,7 L/ha)

Grapholita molesta

I frutticoltori sanno che, ogni giorno, si devono interfacciare con numerose sfide: malattie, parassiti e meteo avverso in primis. Queste variabili devono essere affrontate considerando il contesto normativo che stiamo vivendo e una sempre maggiore richiesta di sostenibilità da parte della filiera.

Per questo gli agricoltori hanno bisogno di strumenti all'altezza del compito.

Quando si parla quindi di protezione delle colture, significa utilizzo di tecnologie mirate ed efficaci, senza impatto sull'entomofauna utile, ed eccellenti profili di sostenibilità.

LA SOLUZIONE

Novità

VYNYTY® Grapholita Pro Press

Di origine naturale by Bayer

Per soddisfare queste esigenze, Bayer mette in campo **VYNYTY Pro Press** che, grazie al potere naturale dei feromoni, offre protezione alle tue colture, senza effetti indesiderati.

VYNYTY Pro Press, di origine naturale e autorizzato in agricoltura biologica, è la nuova soluzione per la confusione sessuale che non lascia residui sulle colture, non ha rischio di resistenze e non ha effetto sulle specie non a target.

VYNYTY Pro Press è la soluzione sostenibile per il controllo degli insetti che stavate aspettando.

VYNYTY Pro Press è l'evoluzione della confusione sessuale.

VYNYTY Grapholita Pro Press è stato ideato per il controllo della Grapholita molesta di Pesco, Nettarine e Albicocco.

Il prodotto si presenta sottoforma di un gel microincapsulato che viene applicato grazie ad un particolare dispenser, messo sotto pressione, direttamente sul tronco degli alberi.

Il gel diffonde omogeneamente e costantemente il feromone e si biodegrada naturalmente al termine della stagione. Nessun residuo plastico quindi da rimuovere al termine dell'annata o che potrebbe inquinare l'ambiente!

VANTAGGI

- **formulazione innovativa: feromoni microincapsulati in gel biodegradabile**
- **lunga durata d'azione: una sola applicazione basta per tutta la stagione**
- **veloce e semplice da applicare**
- **efficace**
- **sostenibile: nessun residuo in campo e nessun effetto sull'entomofauna utile**

*Applicazione su Pesco di **VYNYTY Grapholita Pro Press***

VYNYTY® Grapholita Pro Press

controlla efficacemente le infestazioni di *Grapholita molesta.*

Colture	Dose massima per applicazione	Numero massimo di applicazioni	Bersaglio prima applicazione
Pesco, Nettarina, Albicocco	**1,25 kg/ha** + 10% per ilrinforzo dei confini dell'area	**1** circa 500 gocce/ha	**Prima dell'inizio del primo volo**

COME APPLICARLO IN CAMPO

Al fine di posizionare correttamente il prodotto, si consiglia di monitorare la presenza del parassita prima dell'applicazione di **VYNYTY Grapholita Pro Press**.

Tempo di applicazione: prima del primo volo

Modello di applicazione in campo

Rinforzo dei bordi = doppi punti laterali sul bordo. Assicurarsi che ci sia una goccia all'inizio e alla fine di ogni filare.



Monilia

IL PROBLEMA

La moniliosi è una delle malattie più serie per le Drupacee. I due funghi responsabili, *Monilinia laxa* e *Monilinia fructigena*, hanno caratteristiche simili, anche se il primo tende a prevalere alla ripresa vegetativa, con attacchi quindi su rametti, foglie, germogli, fiori, mentre il secondo è più frequente sui frutti.

I fiori attaccati disseccano e imbruniscono, le foglie avvizziscono e seccano rimanendo attaccate ai rametti che, se infettati, seccano a loro volta presentando fenditure e colatura di gomma. I frutti possono essere attaccati sia all'inizio dello sviluppo, che alla maturazione: in entrambi i casi marciscono ricoprendosi di muffa. Le conseguenze degli attacchi in campo si riscontrano anche nelle fasi di post raccolta, di conservazione e di commercializzazione.

LA SOLUZIONE

La difesa in campo è realizzata nella fase di preraccolta, ma con annate molto umide e piovose è necessario intervenire proteggendo le piante anche in fase di fioritura.

Luna EXPERIENCE — 1 L

Quando: ad inizio fioritura oppure in pre-raccolta.

Dose: 0,6-0,75 L/ha

TELDOR plus — 1 L, 5 L

Quando: 1-2 trattamenti a cavallo della fioritura, 1-2 trattamenti nelle 2 settimane precedenti la raccolta.

Dose: 1-1,5 L/ha

SERENADE ASO — 5 L

Quando: intervenire dallo stadio di pre-fioritura fino a pre-raccolta.

Dose: 4-8 L/ha

Consentito in BIOlogica Agricoltura

DI ORIGINE NATURALE by Bayer

Focus on

SERENADE ASO, a base di *Bacillus subtilis* (ceppo QST 713), grazie alla sua rapidità d'azione, permette di controllare al meglio le patologie delle drupacee. Efficace per il controllo di moniliosi e batteriosi, **Serenade Aso** ha un meccanismo d'azione innovativo: previene direttamente gli attacchi da patologie fungine e batteriche agendo direttamente sui patogeni. Le spore di **Serenade Aso** competono per lo spazio e gli elementi nutritivi limitando lo sviluppo delle malattie ed, interagendo con la pianta, induce reazioni sistemiche di difesa e di promozione della fisiologia.
Serenade Aso è di origine naturale e consentito in agricoltura biologica; è il prodotto ideale per essere inserito in programma di lotta integrata o con l'obiettivo di una riduzione dei residui alla raccolta.

Oidio

IL PROBLEMA

Causata dal fungo *Sphaerotheca pannosa*, l'oidio è una malattia che si manifesta su germogli, foglie e frutti, particolarmente favorita da climi caldi e umidi ma ostacolata da piogge e bagnature prolungate.

È riconoscibile per il caratteristico "feltro miceliale biancastro".

Causa danni tanto più gravi quanto più precoce è l'attacco. La recettività varia in relazione alla cultivar.

Particolarmente sensibili sono nettarine e percoche.

LA SOLUZIONE

La difesa va improntata in relazione alla suscettibilità varietale e al livello di rischio della zona.

Nelle zone di maggior pressione infettiva la difesa si realizza con trattamenti preventivi a partire dalle fasi di scamiciatura e ingrossamento dei frutticini.

Luna EXPERIENCE — 1 L

Quando: interventi preventivi.

Dose: 0,5 L/ha

FLINT MAX — 500 g

Quando: applicazioni preventive.

Dose: 20 g/hl (300 g/ha)

Nota: efficace anche contro monilia.

Folicur WG — 500 g

Quando: in modo preventivo o alla comparsa dei primi sintomi.

Dose: 50-75 g/hl

Nota: efficace anche contro monilia.



Bolla

IL PROBLEMA

Taphrina deformans è un fungo che colpisce soprattutto le foglie del pesco, dove i danni sono più evidenti, ma anche fiori, frutti e germogli. I primi sintomi sono a carico delle foglioline che presentano bollosità che aumentano di volume e tendono a confluire.

Le ipertrofie dei tessuti internervali portano a cambiamenti di colore, deperimento e caduta delle foglie. Il lembo fogliare colpito assume un aspetto brillante in conseguenza alle modificazioni morfologiche dei tessuti colpiti.

La proliferazione disordinata dei tessuti meristematici causa deformazioni irregolari sulle foglie, sui germogli, fino meno frequentemente ad interessare i frutti sui quali, nei casi più gravi si formano le tipiche escrescenze, fino alla cascola.

FLINT MAX — 500 g

Quando: preventivamente a inizio sviluppo vegetativo.

Dose: 20 g/hl (300 g/ha)

Ruggine

IL PROBLEMA

Tranzschelia pruni-spinosae è un fungo che svolge il suo ciclo vitale su due ospiti diversi e precisamente su alcune piante spontanee es. racuncoli uno stadio, mentre l'altro su piante del genere Prunus (susino, albicocco, pesco e mandorlo).

Compare in estate e i danni sono limitati alle foglie con pustole brune sulla pagina inferiore. In annate con prolungate piogge primaverili si possono avere infezioni precoci a carico oltre che delle foglie anche dei frutti e germogli.

Il trattamento risulta indispensabile sulle susine (cultivar europee), quando compaiono le prime pustole e precisamente a fine giugno e fine luglio-inizio agosto.

Folicur WG — 500 g

Quando: in modo preventivo o alla comparsa dei primi sintomi.

Dose: 50 g/hl

Corineo e Cancri rameali

IL PROBLEMA

Il corineo, *Stigmina carpophila*, può attaccare tutte le drupacee.
I sintomi, aspecifici, interessano foglie, frutti e rami e possono essere confusi con altre alterazioni. Si presentano come piccole tacche rosso-violacee circondate da un alone clorotico che successivamente si distacca conferendo il caratteristico aspetto ådi "impallinatura".

I cancri rameali sono una malattia molto grave per il pesco. Colpisce i rametti giovani penetrando attraverso piccole lesioni, causa la necrosi dei tessuti corticali e forma dei cancri depressi dai quali trasuda gomma.
Il loro sviluppo è favorito da un andamento stagionale particolarmente umido.

CUPRAVIT BIO ADVANCED — 1 kg, 10 kg

Quando: trattamenti autunno-invernali

Dose: 170-180 g/hl (efficace anche contro bolla del pesco)

Consentito in BIOlogica Agricoltura

Cancro batterico

IL PROBLEMA

Xanthomonas arboricola pv. pruni colpisce particolarmente il susino, il pesco e l'albicocco.
I sintomi si presentano sulle foglie con tacche nerastre sulla lamina e disseccamento, e sui frutti con maculature rotondeggianti che ne deprezzano il valore sul mercato.

SERENADE ASO — 5 L

Quando: intervenire dallo stadio di pre-fioritura fino a pre-raccolta.

Dose: 4-8 L/ha

Consentito in BIOlogica Agricoltura

DI ORIGINE NATURALE by Bayer

Clorosi ferrica

IL PROBLEMA

La clorosi ferrica è un disordine nutrizionale causato principalmente dalla mancanza di ferro (Fe) nella soluzione del suolo e dall'incapacità delle piante di acquisirne quantità sufficienti al loro fabbisogno. La carenza di Fe si manifesta con ingiallimenti internervali delle foglie e in casi più gravi può portare al disseccamento.
Generalmente il ferro è presente nei terreni in forme non solubili e quindi non disponibili per l'assorbimento radicale.

bolikel® XP — 5 kg

Quando:

- trattamenti preventivi: 25-40 grammi/pianta
- trattamenti curativi: 55-80 grammi/pianta

Focus on

BOLIKEL XP è la risposta più affidabile ed innovativa contro la carenza di ferro. Grazie alla nuova tecnologia «XP» dell'agente chelante HBED, il prodotto è molto più stabile nel terreno perché il ferro è chelato in posizione ortho-ortho al 100% e protetto dai processi di insolubilizzazione; il ferro risulta completamente disponibile per l'assorbimento radicale delle piante.

Nutrizione

Ambition Aktivator è la nuova soluzione di origine naturale che promuove la vigoria e l'ottimale stato di salute delle piante.
Riduce l'impatto degli stress che possono colpire le colture durante la stagione, aumentando l'efficienza dei fertilizzanti, e migliora l'azione degli agrofarmaci.

Ambition® AKTIVATOR — 1 L, 5 L

Quando: nelle fasi fenologiche più critiche

Dose:
1-3 L/ha in applicazione fogliare
2-6 L/ha in fertirrigazione

Consentito in BIOlogica Agricoltura

DI ORIGINE NATURALE by Bayer

Focus on

La particolare formulazione di **Ambition Aktivator** è frutto della combinazione di diversi elementi che concorrono sinergicamente ad una promozione della fisiologia delle piante. La loro unione consente di migliorare svariati aspetti legati non solo alla crescita ed alla qualità, ma anche alla riduzione degli stress durante tutti i momenti più critici del ciclo vitale di una pianta.

- Stimola le naturali difese della pianta;
- Ottimizza la fertilizzazione;
- Riduce le problematiche legate a condizioni ambientali avverse;
- Migliora l'assorbimento dei macro e dei microelementi;
- Aumenta la produttività, promuovendo fioritura, allegagione e i parametri qualitativi
- Promuove l'assorbimento degli agrofarmaci sistemici

Gestione delle infestanti

IL PROBLEMA

Una corretta gestione dell'inerbimento è la pratica fondamentale per poter garantire un ottimale sviluppo vegetativo della pianta, limitando il più possibile l'effetto competitivo delle erbe infestanti sull'acqua e gli elementi nutritivi.

LA SOLUZIONE

L'utilizzo di prodotti erbicidi si rende utile per ridurre l'emergenza delle malerbe attorno alle piante, dove risulta più difficile il controllo.

La strategia d'intervento prevede applicazioni autunnali in caso di giovani impianti e a di elevato potenziale d'infestazione e/o applicazioni autunno-invernali (a caduta delle foglie) che permettono di contenere le malerbe non ancora molto sviluppate, evitando i danni da competizione.

Segue poi l'intervento primaverile, dopo la ripresa vegetativa (prima o dopo la fioritura), che oltre ad avere un effetto di controllo, presenta anche un effetto pacciamante, ottenuto dal progressivo disseccamento delle infestanti, in grado di ridurre l'emergenza delle nuove malerbe.

Questo intervento, se necessario, può essere seguito da ulteriore intervento nel periodo estivo per il contenimento delle malerbe a sviluppo pluriennale.

Roundup®

Dose: Per la dose riferirsi all'etichetta del formulato di interesse.

Lion 5 EC — 1 L, 5 L

Quando: prima che i frutti inizino ad assumere la colorazione specifica.

Dose: 1-2 L/ha in 200-400 litri di acqua

Agrofarmaci per le drupacee

PRODOTTO	CATEGORIA	COMPOSIZIONE	TEMPO CARENZA gg
Ambition Aktivator	Vari	Proteine idrolizzate, acidi fulvici, microelementi	-
Bolikel XP	Vari	Ferro (Fe) chelato 6%; Ferro (Fe) chelato con HBED 6% [in pos. ortho-ortho 100%]	-
Cupravit 35 WG	Fungicidi	Rame metallo 35%	21
Cupravit Bio Advanced	Fungicidi	Rame metallo 30%	Trattamenti autunno-invernali
Cupravit Blu 35 WG	Fungicidi	Rame metallo 35%	21
Decis Evo	Insetticidi	Deltametrina 2,42%	Pesco, albicocco 3, susino, ciliegio 7
Decis Trap Ceratitis	Insetticidi	0,015 g deltametrina/trappola	-
Decis Trap Drosophila	Insetticidi	0,015 g deltametrina/trappola	-
Flint Max	Fungicidi	Trifloxystrobin 25% Tebuconazolo 50%	7
Flipper	Insetticidi	Sali potassici di acidi grassi 47,8%	-
Folicur WG	Fungicidi	Tebuconazolo 25%	7
Lion 5 EC	Erbicidi	Quizalofop-P-etile 5,4%	30
Luna Experience	Fungicidi	Fluopyram 17,7% Tebuconazolo 17,7%	Ciliegio, susino 3, pesco, nettarino, albicocco 7
Movento 48 SC	Insetticidi	Spirotetramat 4,53%	21
Oliocin Plus	Insetticidii	Olio minerale 80%	20
Roundup	Erbicidi	Glifosate acido puro	-
Serenade Aso	Fungicidi	*Bacillus subtilis* ceppo QST 713 1,34 %	-
Teldor Plus	Fungicidi	Fenexamid 42,7 %	3
Vynyty Grapholita Pro Press	Insetticidii	Feromoni sessuali	-

Bayer Crop Science S.r.l.
20156 Milano,
Viale Certosa, 130

www.cropscience.bayer.it

Prodotti fitosanitari autorizzati dal Ministero della Salute; per relativa composizione e numero di registrazione si rinvia al sito internet o all'etichetta dei prodotti. Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta, prestando attenzione alle frasi e ai simboli di pericolo e alle informazioni sul prodotto.

Edizione 2024

Le informazioni contenute in questo stampato sono redatte sulla base di approfondite sperimentazioni ma si intendono fornite a semplice titolo indicativo, poichè l'impiego dei prodotti è al di là di ogni controllo. Bayer CropScience S.r.l. declina ogni responsabilità per uso improprio dei prodotti o nel caso che i prodotti stessi vengano impiegati in violazione di qualsiasi norma. In ogni caso, per il corretto impiego dei prodotti, si rimanda a quanto riportato in etichetta.
Si ringraziano gli autori di Coltura&Cultura per alcune delle foto pubblicate.

® Marchio registrato

MIX
Paper from responsible sources
FSC® C110836

PCF Process Chlorine Free

RICICLATO

Cod. 90967406